

ワクチン類の保管温度

(2022年8月現在)

製剤名と有効期間

保管条件

注) 新型コロナワクチンの貯法と有効期間については、厚生労働省のウェブサイト等で最新の情報を確認し、使用すること。

乾燥 BCG ワクチン【2年】 精製ツベルクリン【3年】	10℃以下
乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン(阪大微研会製)【製造日から3年】*	遮光して10℃以下
インフルエンザ HA ワクチン【製造日から1年・15箇月】** 成人用沈降ジフテリアトキソイド【3年】 沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド【2年】 沈降破傷風トキソイド【2年】 組換え沈降B型肝炎ワクチン(KM バイオロジクス社製)【製造日から2年】* 沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ(セービン株)混合ワクチン【製造日から2年・27箇月】** 沈降精製百日せきジフテリア破傷風混合ワクチン【2年】 乾燥組織培養不活化A型肝炎ワクチン【製造日から3年】 乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン(KM バイオロジクス社製)【製造日から3年】* 乾燥ガスエソウマ抗毒素【10年】 乾燥ジフテリアウマ抗毒素【10年】 乾燥はぶウマ抗毒素【10年】 乾燥ボツリヌスウマ抗毒素【10年】 乾燥まむしウマ抗毒素【10年】 水痘抗原【2年】	遮光し凍結を避けて10℃以下
乾燥ヘモフィルスb型ワクチン【製造日から3年】 乾燥組織培養不活化狂犬病ワクチン【製造日から4年】 黄熱ワクチン1人用【製造日から18箇月】	遮光して2~8℃
沈降13価肺炎球菌結合型ワクチン【製造日から3年】	凍結を避け2~8℃
組換え沈降B型肝炎ワクチン(MSD社製)【製造日から36箇月】* 組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン【製造日から4年】 組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン【製造日から3年】 組換え沈降9価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン【製造日から3年】 不活化ポリオワクチン(ソークワクチン)【製造日から3年】 乾燥組換え帯状疱疹ワクチン【製造日から36箇月】 4価髄膜炎菌ワクチン(ジフテリアトキソイド結合体)【製造日から2年】 経口弱毒生ヒトロタウイルスワクチン【製造日から3年】 5価経口弱毒生ロタウイルスワクチン【製造日から2年】	遮光し凍結を避けて2~8℃
肺炎球菌ワクチン(23価多糖体)【製造日から28箇月】	凍結を避けて2~8℃以下
乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン【1年・18箇月】** 乾燥弱毒生水痘ワクチン【2年】 乾燥弱毒生風しんワクチン【2年】 乾燥弱毒生麻しんワクチン【1年】 乾燥弱毒生麻しん風しん混合(MR)ワクチン【1年・製造日から18箇月】**	遮光して5℃以下

生ワクチン(経口弱毒生ヒトロタウイルスワクチンは除く)は凍結可(添付溶剤の瓶破損に注意)

●有効期間で○年表記しているものは、国家検定合格日からの期間を表す。

製剤ラベルの最終有効年月日を確認すること。

※ メーカーによって保管条件が異なるため、注意すること。

※※ メーカーによって有効期間が異なるため、使用に際しては添付文書を確認すること。

(冷蔵庫に貼るなどして
ご使用ください。)



一般社団法人 日本ワクチン産業協会

〒101-0047 東京都千代田区内神田2-14-4 内神田ビルディング4階 TEL (03) 6206-9660

ホームページ <http://www.wakutin.or.jp/> Eメール mail@wakutin.or.jp